

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU: SKLEROTERAPIA ŻYŁAKÓW ODBYTU

Przed badaniem

Należy poinformować lekarza o:

- Skłonności do uczuleń,
- Aktualnie przyjmowanych lekach
- skłonności do krwawień (skaza krwotoczna)

Dzień przed

- brak innych wskazań

W dniu badania

- Wykonanie jednorazowo wlewki doodbytniczej przy zastosowaniu ENEMY (produkt dostępny w aptece bez recepty) na 5 – 6 godzin przed zabiegiem skleroterapii.

Należy wypełnić:

- ankietę poprzedzającą zabieg skleroterapii
- świadomą zgodę na wykonanie zabiegu skleroterapii
- wywiad epidemiologiczny

Przed/w trakcie

Należy poinformować lekarza o:

- wszelkich nagłych dolegliwościach (np. ból, osłabienie)

Po badaniu

- Bezpośrednio po zabiegu, przez około 20-30 min, może pojawić się pieczenie, które związane jest z działaniem zastosowanego środka.
- Należy stosować się ściśle do zaleceń lekarza,
- Zabieg może wymagać serii powtórzeń.

Pozostałe informacje:

- Zabieg nie wymaga znieczulenia, jest praktycznie bezbolesny (wkłucia dokonuje się w strefie pozbawionej zakończeń nerwowych). Trwa około 20 minut.